

NaCl 0,9% B. Braun

**Soluție de irigare,
sterilă și fără endotoxină**

Compoziție

1000 ml de soluție conțin:

Clorură de sodiu	9.00 g
Electroliți:	mmol/l
Na ⁺	154
Cl ⁻	154

Indicații

Pentru irigare și curățare pe durata intervențiilor chirurgicale.

Pentru irigarea rănilor și arsurilor.

Pentru umezirea tampoanelor pentru răni, materialelor textile și a pansamentelor.

Pentru clătirea și dezinfectarea cateterelor pentru vezică.

Pentru irigare și curățare în tratamente stomatologice.

Pentru clătirea și dezinfectarea instrumentelor și echipamentului.

Pentru irigare intra și post operativă (intervenții endoscopice fără curent HF, după intervenții TUR (transurethral resection)).

Pentru umplerea umezitoarelor de aer ale respiratoarelor (se recomandă utilizarea unui recipient cu volum egal sau mai mare de 100 ml).

Pentru irigarea mecanică a ochilor (se recomandă utilizarea unui recipient de 30 ml).

Pentru irigarea căilor nazale (se recomandă utilizarea unui recipient de 30 ml).

Dozaj

Cantitatea de fluid depinde de condițiile clinice.

Supradozaj

Supradozarea în cazul irigării rănilor și pe durata aplicării intra-operative poate duce la absorbirea fluidului de irigare ceea ce poate duce la hypervolaemia, sub formă de hiperhidratare hipotonică (hyponatraemia).

Durerile de cap, greața, stările de agitație și de dezorientare reprezintă simptomele hiperhidratării. În forme grave se pot instala stări asemănătoare comei.

Contramăsuri în caz de supradozare

Întreruperea irigării, ajustarea echilibrului de apă și electrolit, în funcție de situația clinică dată.

Avertismente și precauții

Nu utilizați pentru infuzie.

Utilizați soluția doar dacă sigiliul este intact și soluția este limpede. Recipientele deschise nu trebuie păstrate, cantitățile neutilizate trebuie aruncate. Reutilizarea dispozitivelor de unică folosință creează un risc potențial pentru pacient sau pentru utilizator. Aceasta poate duce la contaminare și/sau la deteriorarea capacității funcționale. Contaminarea și/sau funcționalitatea limitată a dispozitivului poate duce la vătămarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă există riscul absorbirii unor cantități mari de soluție, cum ar putea fi cazul utilizării acesteia în cavități corporale mari sau pe suprafețe mari de rană, soluția nu trebuie utilizată în cazul pacienților în stare de hiperhidratare. În aceste condiții, se va utiliza cu precauție în cazul pacienților cu

- Deshidratare hipertonice,
- Hipokaliemie,
- Hipernatremie,
- Hipercloremie,
- Tulburări de sănătate în cazul cărora este indicată restricționarea administrării de sodiu, cum ar fi insuficiențele cardiace, edemul generalizat, edemul pulmonar, hipertensiune, eclampsie, insuficiența renală gravă.

NaCl 0,9% B. Braun nu trebuie utilizată pentru procedurile de irigare intratecale.

Reacții adverse

Nu se cunosc.

Data expirării

Soluția nu trebuie utilizată după data de expirare înscrisă pe etichetă.

Data ultimei verificări

0116